

**Título: Tratamiento Homeopático de la Leucorrea Inespecífica. Riobamba.
Enero-Abril/2021**

**Autores: Dr. Alejandro Oretes García Aguilera. MsC. Medicina Bioenergética y Natural
Lic. Derbis Rodríguez Aguilera. MsC. Medicina Bioenergética y Natural**

Resumen:

Se realizó un estudio de tipo cuasi experimental, tomando como universo de trabajo a las pacientes de 20 años y más que acudieron a la consulta de naturopatía de Riobamba, con el diagnóstico de Leucorrea Inespecífica en el período comprendido desde Enero 2021 hasta Abril del mismo año. La muestra fue seleccionada al azar quedando constituido el grupo de estudio por 22 casos y el grupo control por igual número de casos. El grupo de estudio recibió tratamiento homeopático con Medhorrinum por espacio de tres meses, mientras que el grupo control recibió el tratamiento galénico (alopático) habitual con antibióticos y antiinflamatorios por igual tiempo.

Los objetivos fueron contribuir con el uso de la terapéutica Homeopática a un adecuado control de las pacientes adultas con Leucorrea Inespecífica, identificar posible relación de la enfermedad con la Edad, evaluar el efecto del tratamiento homeopático en cuanto al control de la enfermedad y comparar los resultados con los del tratamiento galénico (alopático),

Encontramos que el mayor número de casos se presentó tanto para el grupo de estudio como para el grupo control en las edades de 20 a 30 años y el alivio de los síntomas para el grupo de estudio apareció más tempranamente en la mayoría de los pacientes al igual que la remisión; el tratamiento con Medhorrinum resultó efectivo en el 100.00% de los pacientes.

Palabras claves: Leucorrea, tratamiento homeopático, medhorrinum

ABSTRACT

A quasi-experimental study was carried out, taking as a work universe patients aged 20 and over who attended the Riobamba naturopathy consultation, with the diagnosis of Non-specific Leukorrhoea in the period from January 2021 to April of the same year. . The sample was randomly selected, the study group being made up of 22 cases and the control group of the same number of cases. The study group received homeopathic treatment with Medhorrinum for three

months, while the control group received the usual galenic (allopathic) treatment with antibiotics and anti-inflammatories for the same time.

The objectives were to contribute with the use of homeopathic therapy to an adequate control of adult patients with non-specific leucorrhoea, to identify a possible relationship between the disease and age, to evaluate the effect of homeopathic treatment in terms of disease control and to compare the results with those of galenic (allopathic) treatment,

We found that the highest number of cases occurred for both the study group and the control group at ages 20 to 30 years, and symptom relief for the study group appeared earlier in most patients as well than referral; the treatment with Medhorrinum was effective in 100.00% of the patients

Key words: Leucorrhoea, homeopathic treatment, Medhorrinum

INTRODUCCIÓN:

El desarrollo de la medicina galénica (alopática) es en nuestros días inconmensurable pues como ciencia tiene a su servicio todos los avances tecnológicos alcanzados por ella y por las otras ciencias a su disposición, no obstante a ello, la Homeopatía con más de 200 años de edad, no ha perdido su vigencia y con sus leyes y principios nos ayuda a comprender lo particular de cada caso y resolver entonces lo que resulta difícil de otra forma (1)(2)(3)

La HOMEOPATIA es ARTE y CIENCIA de CURAR Y SU PRINCIPIO FUNDAMENTAL "LO SIMILAR CURA lo SIMILAR", ley biológica que rige toda verdadera curación, nos permite despertar al Sistema Inmunológico y a todos los Sistemas Curativos del individuo para que se llegue al objetivo de toda prescripción médica "LA CURACION DEL PACIENTE".(4)(5)(6)(7)

La Leucorrea inespecífica dentro del capítulo Sepsis Vaginal tiene un importante lugar por lo difícil que en ocasiones se hace su resolución a pesar del arsenal terapéutico disponible de antibióticos y otros quimioterápicos tanto de uso sistémico como local que poseemos.(8)(9)(10)(11)

Por todo lo anteriormente dicho decidimos enfrentar esta manifestación mórbida de un proceso infeccioso, tan difícil de curar en muchos casos, desde la HOMEOPATÍA por poseer también esta formación.

OBJETIVOS:

GENERAL: Contribuir con el uso de la terapéutica Homeopática a un adecuado control de las pacientes adultas con Leucorrea Inespecífica

ESPECÍFICOS:

1. Identificar posible relación de la enfermedad con la edad.
2. Evaluar el efecto del tratamiento homeopático con Medhorrinum en cuanto al control de la enfermedad y comparar los resultados con los del tratamiento galénico (alopático).

MATERIAL Y MÉTODO:

Se realizó un estudio de tipo cuasi experimental, tomando como universo de trabajo a las pacientes de 20 años y más que acudieron a la consulta de naturopatía en la ciudad de Riobamba, con el diagnóstico de Leucorrea Inespecífica en el período comprendido desde Enero hasta Abril del 2021. La muestra fue seleccionada al azar quedando constituido el grupo de estudio por 22 casos y el grupo control por igual número de casos. El grupo de estudio recibió tratamiento homeopático con Medhorrinum por espacio de tres meses, mientras que el grupo control recibió el tratamiento galénico (alopático) habitual con antibióticos y antiinflamatorios en los casos que así lo requirieron.

-Criterios de Inclusión:

- a) Diagnóstico clínico de Leucorrea Inespecífica.
- b) Edad 20 años y más
- c) Disposición para formar parte del estudio.

-Criterios de exclusión:

- a) Edad menor de 20 años.
- b) No disposición a formar parte del estudio.

LEUCORREA INESPECIFICA: Secreción que sale por la vagina de etiología infecciosa inespecífica y que es la expresión de un proceso inflamatorio infeccioso local (colpitis, cervicitis).

GRUPOS DE EDADES:

- .20-30
- .31-40
- .41 y más.

TIEMPO EN QUE APARECIÓ ALIVIO DE LOS SINTOMAS:

- 3 días.
- 7 días
- 15 días.

TIEMPO EN QUE APARECIÓ LA REMISION DEL CUADRO:

- 30 días.
- 60 días.
- 90 días.

EFFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON MEDHORRINUM:

- ✓ EFECTIVO: Se consideró cuando desapareció la leucorrea con el uso del Medhorrinum.
- ✓ No Efectivo: Se consideró cuando no desapareció la leucorrea con el uso del Medhorrinum.

MEDICAMENTO HOMEOPATICO UTILIZADO: MEDHORRINUM.

POTENCIA UTILIZADA: 6 CH (Centesimal Hahnemaniana)

DOSIS: 5 gotas cada 8 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Sublingual.

DURACION DEL TRATAMIENTO: 3 MESES.

Las pacientes se incluyeron en el estudio previo consentimiento informado. Se confeccionó por los autores un registro primario donde se recogieron todos los datos obtenidos de los pacientes y fueron sometidos a un proceso de revisión para detectar posibles errores luego se introdujeron en la Base de datos de una computadora marca Pentium 4 para la realización de su análisis, se realizó la tabulación de los mismos en cuadros de frecuencia simple y de asociación y los resultados se mostraron en números absolutos y valores porcentuales.

ANALISIS Y DISCUSIÓN:


En cuanto a la distribución de los casos según la edad (Cuadro No. 1) encontramos que en el grupo de estudio el mayor número (10 pacientes para un 45,46 por ciento) correspondieron al grupo de 20 a 30 años, siguiéndole el grupo de 31 a 40 años (8 para un 36,36 por ciento) siendo el menor el de 41 y más años (solo 4 para un 18,18 por ciento); comportándose de manera parecida en el grupo control donde el 54,56 por ciento (12 casos) representaron al grupo de 20 a 30 años, el 31,81 por ciento (7 casos) de 31 a 40 años y el 13,63 por ciento (3 casos) al grupo de 41 y más años; lo cual se corresponde con la bibliografía revisada(1)(5)(6) y pensamos se encuentre en relación con una mayor actividad sexual

Cuadro No. 1. Distribución de los casos según edad.

Edad (Años)	Grupo Estudio		Grupo Control	
	No	%	No	%
20 – 30	10	45.46	12	54.56
31 – 40	8	36.36	7	31.81
41 y Mas	4	18.18	3	13.63
TOTAL	22	100.00	22	100.00

Fuente: Datos de los autores

Gráfico No. 1. Distribución de los casos según edad



Al analizar el tiempo en que apareció el alivio de los síntomas (Cuadro No. 2) pudimos ver que, en el grupo de estudio, en los primeros 3 días lo obtuvieron 7 pacientes (31,81 por ciento), mientras que en el grupo control solo lo obtuvo 1 paciente (4,54 por ciento); a los siete días en el grupo estudio 10 pacientes (45,46 por ciento) y 7 pacientes (31,81 por ciento) en el grupo control; y a los quince días en el grupo estudio 7 pacientes (31,81 por ciento) mientras que en el grupo control 14 pacientes para el 63,65 por ciento. No encontramos referencia bibliográfica de otros estudios comparativos realizados; pero que llama la atención pues el mayor número de casos para el grupo estudio resolvió a los siete días siguiéndole en orden 3 días y por último 15 días, mientras que en el grupo control el comportamiento fue completamente distinto, apareciendo el mayor número de casos con alivio de los síntomas a los quince días, siguiéndole 7 y por último 3 días. Todo esto nos deja ver que el tratamiento homeopático llevó a los pacientes a un alivio más temprano de la sintomatología presentada.


Cuadro No. 2. Tiempo en que apareció alivio de los síntomas.

Tiempo (Días)	Grupo Estudio		Grupo Control	
	No	%	No	%
3	7	31.81	1	4.54
7	10	45.46	7	31.81
15	5	22.73	14	63.65

TOTAL	22	100.00	22	100.00
--------------	----	--------	----	--------

Fuente: Datos de los autores

Gráfico No. 2. Tiempo en que apareció alivio de los síntomas.




Cuando analizamos el tiempo en que apareció la remisión del cuadro clínico (Cuadro No.3) encontramos que en el grupo de estudio 18 pacientes (81,82 por ciento) remitieron la sintomatología en 30 días y 4 pacientes (18,18 por ciento) en 60 días ; mientras que en el grupo control 12 pacientes (54,56 por ciento) remitieron en 60 días, 9 pacientes (40,90 por ciento) en 30 días y 1 (4,54 por ciento) en 90 días ; tampoco tenemos referencia de otros estudios realizados al respecto, pero si nos percatamos que la remisión fue alcanzada por el mayor número de casos en solo 30 días para el grupo de estudio, comportándose de diferente manera para el grupo control con el mayor número de casos a los 60 días.

Cuadro No. 3. Tiempo en que apareció la remisión del cuadro.

Tiempo (Días)	Grupo Estudio		Grupo Control	
	No	%	No	%
30	18	81.82	9	40.90
60	4	18.18	12	54.56
90	0	0	1	4.54
TOTAL	22	100.00	22	100.00

Fuente: Datos de los autores

Gráfico No. 3. Tiempo en que apareció la remisión del cuadro.



En cuanto a la efectividad del tratamiento con Medhorrinum (Cuadro No. 4), observamos que resultó efectivo para cada uno de los grupos de edades en un 100.00 % de los casos.

Cuadro No. 4. Efectividad del tratamiento con Medhorrinum

Edad (Años)	EFECTIVO		No Efectivo	
	No	%	No	%
20 – 30	10	45.46	0	0
31 – 40	8	36.36	0	0
41 y Mas	4	18.18	0	0
TOTAL	22	100.00	0	0

CONCLUSIONES:

1. El mayor número de los casos se presentó tanto para el grupo de estudio como para el grupo control en las edades de 20 a 30 años.
2. El alivio de los síntomas para el grupo de estudio apareció más tempranamente para la mayoría de los pacientes, mientras que para el grupo control el mayor número de los casos se presentó tardíamente.
3. La remisión del cuadro en el grupo de estudio apareció para la mayoría de los pacientes a los 30 días mientras que en el grupo control fue a los 60 días.

4. El tratamiento con Medhorrinum resultó Efectivo para cada uno de los grupos de pacientes en un 100.00 % de los casos

RECOMENDACIONES:

1- Incrementar la utilización del Medhorrinum en el tratamiento de la Leucorrea Inespecífica.

ANEXOS:

REGISTRO PRIMARIO:

1. Nombre y apellidos:
2. Edad:
3. Medicamentos utilizado:
 - a) Homeopático (Medhorrinum)___
 - b) Galénicos (alopáticos)___
4. Tiempo en que apareció el alivio de los síntomas:
. 3 días ___
. 7 días ___
. 15 días ___
5. Tiempo en que apareció la remisión de los síntomas:

.30 días ___
.60 días ___
.90 días ___

ASPECTOS BIOETICOS:

(CONSENIAMIENTO INFORMADO)

Yo: _____ estoy de acuerdo en
(Nombre y Apellidos)
participar voluntariamente como paciente en el presente estudio

Firma de la paciente

Firma del Médico

BIBLIOGRAFÍA:

1. Vannier L. Compendio de terapéutica homeopática. -- México: Ed. Porrúa, 1995.
2. Miller Joan A. Homeopatía. Rev. Med Gen Integr 1997; 156: 26-30.
3. Brenes AS. Homeopatía y currículum de medicina. Rev. Costarricense Ciencias Médicas 1997; 16(1,2): 83-99.
4. Hahnemann Samuel. Organón de la Medicina.-- 6 ed.-- México: Ed. Porrúa, 1984.
5. Hahnemann Samuel. 90 Medicamentos Homeopáticos.--2 ed.-- México: Ed. Porrúa, 1988.
6. Steegers Martín N. Estado actual de la homeopatía en Cuba. Rev Cub Med Gen Integr 1997; 13(1): 203-214.
7. Almunia Leyva AL. Homeopatía. Rev Cub Med Gen Integr 1997; 13(4): 369-371.
8. Poitevin B. Integración de la homeopatía. Rev Soc Med Homeopatía Ecuat 1999; 77(2): 160-166.
9. Walshe Brian A. Hacia la Globalización. Rev Soc Med Homeopatía Ecuat 1999: 50-59.
10. Arlet Anderson JC. 200 Años. Es como si fuera ayer. Rev. Soc. Med. Homeopatía Ecuat 1996: 42-46.

11. Flores Villalta F. Elección de escala. Rev. Soc. Med Homeopatía Ecuat
1997: 61-614.